

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 476.01/2026
CARGO: MÉDICO – TODAS AS ÁREAS

OBSERVAÇÃO: Este caderno contém 20 (vinte) questões, para cada questão são apresentadas 04 (quatro) alternativas de resposta (a, b, c, d), sendo que o candidato deverá escolher apenas uma e, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preencher todo o quadrado correspondente no cartão-resposta.

LÍNGUA PORTUGUESA

01 – [VUNESP, 2026] - Leia a tira a seguir para responder à questão:



As falas do menino sugerem que ele:

- a) acredita que os adultos estão certamente preservando a natureza.
- b) se mostra indiferente ao comportamento das pessoas adultas.
- c) tem consciência de que os adultos estão destruindo a natureza.
- d) prefere viver a sua infância a preocupar-se com a natureza.

02 – [AVANÇASP, 2026] “_____ a este documento as portarias de nomeação que foram solicitadas através de e- mail por esse departamento.” Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado acima.

- a) Seguem anexo
- b) Seguem anexos
- c) Seguem anexas
- d) Segue anexas

03 – [PROMUN, 2026] Marque a alternativa em que a série de palavras está correta quanto à ortografia.

- a) Obsessão, catequisar, distenção, irascível.
- b) Transcender, pretenção, broxe, alforge.
- c) Jiboia, subterfúgio, manjerição, vagem.
- d) Fantoxe, enchurrada, encharcar, mexerico.

04 – [OBJETIVA CONCURSOS, 2026] “A única verdade que realmente sei: os seres humanos me assombram.” (Markus Zusak). A palavra sublinhada tem por antônimo:

- a) Aterrorizam.
- b) Perturbam.
- c) Espantam.
- d) Enlevam.

05 – [FGV, 2026] Marque a opção em que os dois vocábulos mudam de sentido conforme o gênero.

- a) cabeça / capital.
- b) ponte / vogal.
- c) corneta / líder.
- d) chefe / gênese.

CONHECIMENTOS GERAIS

06 – A formação territorial e política de Primavera do Leste está diretamente relacionada ao processo de ocupação do sudeste mato-grossense nas décadas de 1970 e 1980. Sobre a evolução histórica do município, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Primavera do Leste foi inicialmente distrito do município de Rondonópolis, tendo sido emancipado na década de 1970 em razão da expansão da mineração.
- b) O município foi criado a partir da divisão territorial de Campo Verde, tornando-se distrito em 1985 e sendo elevado à categoria de município somente após a Constituição Federal de 1988.
- c) A cidade surgiu a partir de um projeto de colonização privada implantado em 1979, inicialmente pertencendo ao município de Poxoréu como distrito, até conquistar sua emancipação político-administrativa na década de 1980.
- d) A ocupação de Primavera do Leste teve origem em um projeto de colonização federal conduzido pelo INCRA, sem participação da iniciativa privada, sendo elevada diretamente à categoria de município.

07 – Primavera do Leste está localizada em qual região do estado de Mato Grosso?

- a) Norte Mato-grossense.
- b) Oeste Mato-grossense.
- c) Noroeste Mato-grossense.
- d) Sudeste Mato-grossense.

08 – O Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso é exercido:

- a) Pela Câmara dos Deputados.
- b) Pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
- c) Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
- d) Pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

09 – [INSTITUTO ACCESS, 2026] O conceito de desenvolvimento sustentável busca conciliar crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. Esse entendimento orienta políticas públicas e acordos internacionais, e a integração dessas dimensões é um desafio permanente. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta.

- a) Políticas sustentáveis são incompatíveis com o crescimento econômico.
- b) O desenvolvimento sustentável integra dimensões econômica, social e ambiental.
- c) O crescimento econômico isolado define a sustentabilidade.
- d) A preservação ambiental exclui o desenvolvimento social.

10 – [INSTITUTO ACCESS, 2026] O conceito de segurança ampliou-se nas últimas décadas, incorporando dimensões além da militar. Segurança humana, alimentar e cibernética são exemplos dessa ampliação. Esse enfoque influencia políticas públicas e cooperação internacional. Sobre esse tema é correto afirmar que:

- a) A segurança contemporânea inclui dimensões humanas, sociais e tecnológicas.
- b) A segurança nacional restringe-se exclusivamente ao aspecto militar.
- c) A ampliação do conceito de segurança elimina conflitos.
- d) A cooperação internacional é irrelevante para a segurança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 – [FÊNIX INSTITUTO, 2026] Um paciente em uso crônico de anticoagulante oral apresenta sangramento espontâneo após introdução recente de antibiótico macrolídeo. A interação medicamentosa ocorreu por:

- a) inibição enzimática.
- b) indução hepática.
- c) ligação proteica.
- d) excreção renal.

12 – [VUNESP, 2026] Mulher de 40 anos com doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, síndrome dos ovários policísticos e pré-diabetes comparece para avaliação de falta de ar aos esforços. O exame cardiovascular não apresenta alterações. O teste de esforço sugere um acentuado descondicionamento físico. IMC atual: 43 kg/m². A paciente deseja evitar a cirurgia bariátrica. O especialista em fertilidade recomenda uma perda de peso de 20% antes de iniciar os tratamentos de fertilização assistida. O medicamento que tem maior probabilidade de facilitar essa perda de peso ($\geq 20\%$) é:

- a) semaglutida.
- b) tirzepatida.
- c) lisdexanfetamina.
- d) liraglutida.

13 – [FÊNIX INSTITUTO, 2026] Durante um procedimento cirúrgico abdominal, a ligadura inadvertida de uma artéria comprometeu a irrigação primária do intestino delgado proximal, resultando em isquemia significativa do jejuno inicial. Considerando a anatomia vascular do trato gastrointestinal, a artéria mais provavelmente envolvida foi a:

- a) artéria mesentérica superior.
- b) artéria mesentérica inferior.
- c) artéria gástrica esquerda.
- d) artéria hepática comum.

14 – [UNIFIL, 2026] Maria, 67 anos, hipertensa e com insuficiência cardíaca, apresenta PA 80/50 mmHg, FC 160 bpm, irregularmente irregular, paciente sudorética e confusa. Ausculta cardíaca sem sopros e estertores bibasais leves. Apresentando queixa principal: palpitações súbitas, tontura e sensação de desmaio há 30 minutos. ECG mostra fibrilação atrial com resposta ventricular rápida (~160 bpm). Hemograma, eletrólitos e função renal dentro da normalidade. Levando em consideração o quadro clínico, qual a conduta mais adequada nesta paciente?

- a) Administrar verapamil intravenoso para controle da frequência.
- b) Administrar antiarrítmico intravenoso de ação lenta e monitorizar, sem cardioversão imediata.
- c) Realizar cardioversão elétrica imediata com 200J.
- d) Realizar cardioversão química imediata.

15 – [VUNESP, 2026] Lactente, sexo feminino, com 40 dias de vida, apresenta cansaço e sudorese abundante durante as mamadas desde o nascimento, com piora nos últimos dias. Ao exame físico, apresenta hipotonia, frouxidão ligamentar, epicanto palpebral, protrusão lingual e prega palmar única. Murmúrio vesicular presente e simétrico, com roncos difusos; frequência respiratória de 60 ipm, com tiragem subdiafragmática e retração intercostal. Bulhas rítmicas em dois tempos com sopro sistólico em borda esternal esquerda. A cardiopatia mais provável de essa criança apresentar é

- a) comunicação interatrial.
- b) defeito do septo atrioventricular.
- c) estenose pulmonar.
- d) tetralogia de Fallot.

16 – [FACAPE, 2026] Sobre as neoplasias mais frequentemente diagnosticado em homens idosos e seu tratamento inicial baseado em estadiamento e risco, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O câncer de próstata é o mais frequente em homens idosos, e o manejo depende do risco: pacientes de baixo risco pode ser acompanhados com vigilância ativa.
- b) O câncer de fígado é o mais comum nessa população, sendo indicada ressecção cirúrgica para todos os pacientes com lesões únicas.
- c) O câncer de bexiga é o mais prevalente em idosos, e o tratamento inicial padrão é cistectomia radical em todos os casos.
- d) O câncer mais comum em homens idosos é o de pulmão, e o tratamento de escolha em todos os casos localizados é lobectomia seguida de quimioterapia adjuvante.

17 – [FACAPE, 2026] Homem de 71 anos com perda de peso e queixas de esquecimentos com maior frequência. Exames: Hb 9,8 g/dL; VCM 110 fL; RDW 19%; Leuco 3.100/mm³ (neutropenia leve); PlaQ 118.000/mm³; reticulócitos baixos; DHL elevada; bilirrubina indireta discretamente elevada.

Assinale a alternativa CORRETA sobre a conduta inicial.

- a) O VCM elevado exclui deficiência de ferro concomitante.
- b) Iniciar reposição de B12 antes / associada ao folato.
- c) O padrão sugere hemólise extramedular; iniciar ácido fólico.
- d) Iniciar ácido fólico isolado, pois corrige anemia e neuropatia simultaneamente.

18 – [FGV, 2025] No Brasil, o tratamento sintomático da doença de Alzheimer é baseado no uso de inibidores da acetilcolinesterase e de um antagonista do receptor NMDA. Considerando o uso do antagonista do receptor NMDA, esse medicamento é melhor indicado em caso de

- a) doença de Alzheimer leve.
- b) transtorno cognitivo leve.
- c) doença de Alzheimer leve a grave.
- d) doença de Alzheimer moderada a grave.

19 – [FGV, 2025] Superantígenos são antígenos:

- a) tipicamente encontrados nas infestações por nematelmintos.
- b) de maior peso molecular.
- c) muito relacionados ao desencadeamento do eczema de contato imunológico.
- d) que não necessitam obrigatoriamente das células apresentadoras de antígeno para ativação policlonal de linfócitos T.

20 – [FEPESE, 2025] O controle glicêmico do diabetes melito tipo 2 (DM2) deve ser individualizado no idoso saudável 60+ com poucas comorbidades crônicas, estado funcional e cognitivo preservado. Nestes casos a meta glicêmica a ser atingida é de:

- a) Hemoglobina glicada HbA1c (%) < 5,5; glicemia de jejum (mg/dL) 80-130; glicemia 2 horas pós prandial (mg/dL) < 150; glicemia ao deitar-se (mg/dL) 90-150.
- b) Hemoglobina glicada HbA1c (%) < 8,0; glicemia de jejum (mg/dL) 90-150; glicemia 2 horas pós prandial (mg/dL) < 180; glicemia ao deitar-se (mg/dL) 100-180.
- c) Hemoglobina glicada HbA1c (%) < 9,0; glicemia de jejum (mg/dL) 100-180; glicemia 2 horas pós prandial (mg/dL) < 200; glicemia ao deitar-se (mg/dL) 110-200.
- d) Hemoglobina glicada HbA1c (%) < 7,5; glicemias de jejum (mg/dL) 80-130; glicemia 2 horas pós prandial (mg/dL) < 180; glicemia ao deitar-se (mg/dL) 90-150.