

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 476.01/2026
CARGO: MÉDICO INTERVENCIONISTA DO SAMU

OBSERVAÇÃO: Este caderno contém 20 (vinte) questões, para cada questão são apresentadas 04 (quatro) alternativas de resposta (a, b, c, d), sendo que o candidato deverá escolher apenas uma e, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preencher todo o quadrado correspondente no cartão-resposta.

LÍNGUA PORTUGUESA

01 – [VUNESP, 2026] - Leia a tira a seguir para responder à questão:



As falas do menino sugerem que ele:

- a) acredita que os adultos estão certamente preservando a natureza.
- b) se mostra indiferente ao comportamento das pessoas adultas.
- c) tem consciência de que os adultos estão destruindo a natureza.
- d) prefere viver a sua infância a preocupar-se com a natureza.

02 – [AVANÇASP, 2026] “_____ a este documento as portarias de nomeação que foram solicitadas através de e- mail por esse departamento.” Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado acima.

- a) Seguem anexo
- b) Seguem anexos
- c) Seguem anexas
- d) Segue anexas

03 – [PROMUN, 2026] Marque a alternativa em que a série de palavras está correta quanto à ortografia.

- a) Obsessão, catequisar, distenção, irascível.
- b) Transcender, pretensão, broxe, alforge.
- c) Jiboia, subterfúgio, manjerição, vagem.
- d) Fantoxe, enchurrada, encharcar, mexerico.

04 – [OBJETIVA CONCURSOS, 2026] “A única verdade que realmente sei: os seres humanos me assombram.” (Markus Zusak). A palavra sublinhada tem por antônimo:

- a) Aterrorizam.
- b) Perturbam.
- c) Espantam.
- d) Enlevam.

05 – [FGV, 2026] Marque a opção em que os dois vocábulos mudam de sentido conforme o gênero.

- a) cabeça / capital.
- b) ponte / vogal.
- c) corneta / líder.
- d) chefe / gênese.

CONHECIMENTOS GERAIS

06 – A formação territorial e política de Primavera do Leste está diretamente relacionada ao processo de ocupação do sudeste mato-grossense nas décadas de 1970 e 1980. Sobre a evolução histórica do município, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Primavera do Leste foi inicialmente distrito do município de Rondonópolis, tendo sido emancipado na década de 1970 em razão da expansão da mineração.
- b) O município foi criado a partir da divisão territorial de Campo Verde, tornando-se distrito em 1985 e sendo elevado à categoria de município somente após a Constituição Federal de 1988.
- c) A cidade surgiu a partir de um projeto de colonização privada implantado em 1979, inicialmente pertencendo ao município de Poxoréu como distrito, até conquistar sua emancipação político-administrativa na década de 1980.
- d) A ocupação de Primavera do Leste teve origem em um projeto de colonização federal conduzido pelo INCRA, sem participação da iniciativa privada, sendo elevada diretamente à categoria de município.

07 – Primavera do Leste está localizada em qual região do estado de Mato Grosso?

- a) Norte Mato-grossense.
- b) Oeste Mato-grossense.
- c) Noroeste Mato-grossense.
- d) Sudeste Mato-grossense.

08 – O Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso é exercido:

- a) Pela Câmara dos Deputados.
- b) Pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
- c) Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
- d) Pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

09 – [INSTITUTO ACCESS, 2026] O conceito de desenvolvimento sustentável busca conciliar crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. Esse entendimento orienta políticas públicas e acordos internacionais, e a integração dessas dimensões é um desafio permanente. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta.

- a) Políticas sustentáveis são incompatíveis com o crescimento econômico.
- b) O desenvolvimento sustentável integra dimensões econômica, social e ambiental.
- c) O crescimento econômico isolado define a sustentabilidade.
- d) A preservação ambiental exclui o desenvolvimento social.

10 – [INSTITUTO ACCESS, 2026] O conceito de segurança ampliou-se nas últimas décadas, incorporando dimensões além da militar. Segurança humana, alimentar e cibernética são exemplos dessa ampliação. Esse enfoque influencia políticas públicas e cooperação internacional. Sobre esse tema é correto afirmar que:

- a) A segurança contemporânea inclui dimensões humanas, sociais e tecnológicas.
- b) A segurança nacional restringe-se exclusivamente ao aspecto militar.
- c) A ampliação do conceito de segurança elimina conflitos.
- d) A cooperação internacional é irrelevante para a segurança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 – [FÊNIX INSTITUTO, 2026] Um paciente em uso crônico de anticoagulante oral apresenta sangramento espontâneo após introdução recente de antibiótico macrolídeo. A interação medicamentosa ocorreu por:

- a) inibição enzimática.
- b) indução hepática.
- c) ligação proteica.
- d) excreção renal.

12 – [VUNESP, 2026] Homem de 22 anos de idade relata consumo de 18g de paracetamol há 6 horas e apresenta náuseas e vômitos há 1 hora. Nega uso de outras medicações. AP: nega. Exame físico sem alterações. Sem disponibilidade de dosagem sérica da droga.

O tratamento inicial deve ser:

- a) administração de carvão ativado.
- b) remoção extracorpórea com hemodiálise intermitente.
- c) infusão de N-acetilcisteína imediatamente.
- d) lavagem gástrica.

13 – [QUADRIX, 2025] Assinale a opção que apresenta a conduta adequada diante de um paciente do sexo masculino de 39 anos de idade trazido pelo SAMU, que chegou ao pronto-socorro com PA 130 x 90 mmHg, FC: 75 bpm, FR: 12 imp, após ter sofrido uma facada, há uma hora, na região abdominal ao nível da cicatriz umbilical, sendo que a faca ainda estava presa no abdome, devidamente fixada pela equipe pré-hospitalar, apresentando-se pulsátil à inspeção.

- a) manter a faca e indicar angiografia da aorta abdominal.
- b) manter a faca, solicitar angiotomografia de abdome total e, posteriormente, laparotomia exploradora.
- c) retirar a faca e indicar laparotomia exploradora.
- d) manter a faca até a realização da laparotomia exploradora.

14 – [VUNESP, 2026] Paciente de 45 anos, previamente saudável, é atendido após uma parada cardíaca testemunhada em casa. O SAMU realizou reanimação cardiopulmonar por 10 minutos, com retorno à circulação espontânea após desfibrilação devido à fibrilação ventricular. Apresentava no eletrocardiograma pós-ressuscitação: intervalo QTc prolongado (520 ms). Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta adotada para esse caso clínico.

- a) Monitoramento em unidade coronariana sem intervenção adicional.
- b) Tratamento com amiodarona em longo prazo.
- c) Realização de cintilografia do miocárdio como próximo passo.
- d) Indicação de implante de cardiodesfibrilador implantável.

15 – [INSTITUTO AOCP, 2026] Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), diante de um caso grave de anafilaxia com repercussão hemodinâmica de hipotensão associado a broncoespasmo, qual é a conduta prioritária e imediata do médico?

- a) Acionar o SAMU e aguardar a chegada da equipe avançada.
- b) Realizar intubação orotraqueal profilática.
- c) Administrar primeiramente um anti-histamínico H1 por via endovenosa.
- d) Administrar adrenalina (epinefrina) 1:1.000, por via intramuscular.

16 – [COMPERVE, 2025] Primigesta com 37 semanas de gestação, apresentou crise convulsiva tônico-clônica generalizada há cerca de 30 minutos. Foi atendida pelo SAMU, e recebeu 4 g de sulfato de magnésio por via intravenosa, sendo encaminhada à maternidade. No momento da avaliação, encontrava-se assintomática, consciente, vigil, com pressão arterial de 140x100 mmHg e diurese de 50 ml/h. Considerando esse quadro, o próximo passo na conduta para profilaxia de nova convulsão deve ser

- a) realizar cesárea o mais breve possível.
- b) administrar sulfato de magnésio na dose de 1 g/hora, via endovenosa, por 24 horas.
- c) iniciar indução do parto vaginal com 25 mcg de misoprostol, via vaginal a cada 4 horas.
- d) administrar 100 mg de fenitoína, via endovenosa, a cada 12 horas.

17 – [VUNESP, 2026] Mulher de 53 anos é levada ao pronto-socorro pelo SAMU após seu vizinho encontrá-la pouco responsiva e confusa. Ela abre os olhos apenas ao estímulo doloroso; está desorientada e não é capaz de fornecer um histórico claro. Ela retrai todas as extremidades à pressão do leito ungueal. Qual achado adicional deve levantar uma maior probabilidade de isquemia da circulação posterior?

- a) Convulsão.
- b) Desvio do olhar conjugado.
- c) Febre.
- d) Hemiparesia.

18 – [COMPERVE, 2025] Um paciente de 25 anos, vítima de acidente de motocicleta há cerca de 01 hora, foi levado ao Centro de Trauma por uma equipe do SAMU. Ele está consciente, mas confuso, com Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 14. O paciente relata dor torácica e “falta de ar”. O exame físico inicial revela frequência respiratória de 28 ipm, PA = 110/60 mmHg, taquicardia (FC = 110 bpm), ausculta pulmonar com murmúrio vesicular não audível à direita associado a timpanismo. O abdome está flácido, sem sinais de irritação peritoneal. O pulso central é fraco. Não há acesso a exames complementares de imagem no momento. Considerando o quadro clínico do paciente, a conduta inicial mais adequada do médico plantonista será realizar:

- a) toracostomia à direita.
- b) toracocentese à direita.
- c) toracotomia à direita.
- d) toracectomia à direita.

19 – [INSTITUTO CONSULPAM, 2026] Sobre os conceitos temporais no atendimento do IAMCST, um paciente inicia sintomas anginosos às 08h00, chama o SAMU às 08h40, é avaliado na ambulância às 09h10 e tem o ECG interpretado como supradesnivelamento do segmento ST às 09h15. É transferido e realiza angioplastia primária com reperfusão às 10h45. Nesse caso, o tempo-0 e o tempo total de isquemia (ΔT) correspondem, respectivamente, a:

- a) 09h15 e 2 horas e 45 minutos.
- b) 09h10 e 1 hora e 30 minutos.
- c) 09h10 e 2 horas e 45 minutos.
- d) 08h40 e 2 horas e 5 minutos.

20 – [INSTITUTO CONSULPAM, 2026] Um paciente é trazido pelo SAMU em crise convulsiva tônico-clônica generalizada há cerca de 10 minutos. No momento, apresenta cianose periférica e saturação de 88%. Já possui acesso venoso calibroso. De acordo com as recomendações da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) para o manejo de crises agudas, a conduta imediata e a dose de manutenção (se persistir a crise) são, respectivamente:

- a) Fenitoína 20mg/kg e Midazolam 10mg IM.
- b) Diazepam 10mg IV e Fenitoína 15 a 20mg/kg IV.
- c) Fenobarbital 20mg/kg e Diazepam 10mg IV.
- d) Lorazepam 0,1mg/kg IV e Tiopental 5mg/kg IV.